


Pararendzina aus Löss

Albacher Hof, Lich / Hessen

Maße Rahmen außen / Rahmen innen: 36,2 x 136,2 cm / 30 x 130 cm

Gewicht: 23 kg



Ap aktuelle Pflugzone

-----

rAp reliktsche Pflugzone; mucheliger Bruch der Aggregate an der Untergrenze ist Indiz höchster Verdichtung

-----

elCvkc durch Kalkausfällung verkitteter Primärlöss; insitu Bildungen von Lösskindl

-----

II elCvc umgelagerter Primärlöss mit vereinzelt Basaltbrocken und Kleinlapilli aus dem Rhönkomplex weisen auf den gelifluktiven Sedimentationscharakter des Substrates; vereinzelt insitu Bildungen von Lösskindl

-----

III elCvc unterster Abschnitt des umgelagerten Primärlösses; leichte Schlieren und Vermischungen mit dem unterlagernden rötlich gefärbten Löss zeigen die Umlagerungsdynamik

-----

IV fBtc Erosionsreste einer fossilen Lessivébildung; der ursprünglich kalkfreie Bt-Horizont ist durch die weichselzeitliche Aufwehung von Primärlöss nachträglich aufgekalkt; Basaltbrocken und Kleinlapilli belegen den gelifluktiven Sedimentationscharakter des Substrates



Basaltbrocken in 11 dm Tiefe u. GOF belegen den gelifluktiven Sedimentationscharakter des Substrates; polygonales Netz von Frostrissen im fossilen Btc-Horizont zeigen die periglaziären Klimabedingungen zur Zeit der Primärlössaufwehung