



Hintergrundwerte organischer Schadstoffe in hessischen Böden

		PCDD/F I-TEq <sup>1</sup>	PCDD/F WHO-TEq <sup>2</sup>	dI-PCB WHO-TEq <sup>2</sup>
		ng TEq/kg TM		
<b>Acker Oberboden</b>				
n		36	36	36
Typ 0	50.P.	1,0	0,9	0,26
	90.P.	1,6	1,4	0,55
n		28	28	27
Typ A	50.P.	1,0	0,9	0,24
	90.P.	1,3	1,2	0,34
<b>Grünland Oberboden</b>				
n		95	95	93
Typ 0	50.P.	1,2	1,2	0,28
	90.P.	2,2	1,9	0,48
n		76	76	74
Typ A	50.P.	1,2	1,1	0,27
	90.P.	2,3	2,0	0,43
<b>Weinbau Oberboden</b>				
n		38	38	36
Typ 0 <sup>3</sup>	50.P.	1,4	1,3	0,33
	90.P.	3,6	3,2	0,78
<b>Wald Auflage (Of, Oh, Of+Oh)</b>				
n		22	22	21
Typ 0 <sup>3</sup>	50.P.	6,0	5,5	2,57
	90.P.	22,6	21,0	14,50
<b>Wald Oberboden</b>				
n		25	25	23
Typ 0 <sup>3</sup>	50.P.	9,1	7,9	3,32
	90.P.	27,8	24,8	9,95

<sup>1</sup> I-TEq, exklusive Bestimmungsgrenze (lower bound)

<sup>2</sup> WHO-TEq 2005, exklusive Bestimmungsgrenze (lower bound)

<sup>3</sup> Anteil von Standorten in Verdichtungsräumen (Typ B) ca. 30 %