1 Böden aus organogenen Substraten

1.1 Böden aus Niedermoortorf und Auensedimenten

61 Auenanmoorgleye und Niedermoore mit Auengleyen aus >10 dm Auenschluff, –lehm, –ton und Torf in unterschiedlicher Schichtung (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän)

121 Anmoorgleye und Niedermoore aus 2 bis 10 dm Torf, z.T. über Auenlehm oder –ton (Holozän) oder Hochflutlehm oder –ton, über Terrassen–, Schwemm– oder Flugsand (Pleistozän), örtl. über Zersatz aus basaltischem Vulkanit oder Tonmergel (Tertiär)

19 Niedermoore mit Auengleyen und Naßgleyen, örtl. aus 2 bis >10 dm Auenschluff, –lehm und/oder –ton, über/aus 5 bis >20 dm Torf, meist über 2 bis 10 dm Stillwasserlehm oder –ton (Holozän), über Terrassensand (Pleistozän)

33 Niedermoore mit Auengleyen und Naßgleyen, örtl. aus 2 bis >10 dm Auenschluff, –lehm und/oder –ton, über/aus 5 bis >20 dm Torf, meist über 2 bis 10 dm Stillwasserlehm oder –ton (Holozän), über Terrassensand (Pleistozän)

31 Niedermoore mit Auengley und Auenanmoorgleyen, örtl. aus 2 bis 9 dm Auenschluff, –lehm und/oder –ton, über/aus 2 bis >10 dm Torf, meist über 2 bis >10 dm Stillwasserlehm oder –ton (Holozän), über Terrassensand (Pleistozän)

62 Niedermoore mit Auenanmoorgleyen aus 3 bis 8 dm Torf (Holozän), z.T. über 3 bis 8 dm Auenschluff, –lehm (Holozän) und/oder Seekreide (Pleistozän), über Terrassensand (Pleistozän)

60 Niedermoore, örtl. aus 2 bis 4 dm Auenschluff, über/aus Torf, z.T. über Auenschluff (Holozän)

1.2 Böden aus Hochmoortorf

420 Moorstagnogleye aus 1 bis 10 dm Torf (Holozän) über 1 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit Ton– bis Sandstein (Buntsandstein)

457 Hangmoorgleye aus 2 bis 3 dm Torf (Holozän) über 3 bis 4 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit Ton– bis Sandstein (Buntsandstein)

442 Quellenmoorgleye mit Hochmoorgleyen aus 2 bis 3 dm Torf (Holozän) über 12 bis >18 dm Kolluvial– oder Auensediment (Holozän) oder fluvialen Sedimenten (Pleistozän) oder Fließschutt (Basislage) mit Sand– bis Tonstein (Buntsandstein)

325 Übergangsmoore mit Quellenmoorgleyen aus bis 8 dm Torf (Holozän) über Fließerde (Hauptlage) und/oder Fließschutt (Basislage) mit Quarzit, örtl. quarzitischem Sandstein (Taunusquarzit, örtl. Hermeskeilsandstein)

326 Hochmoore mit Moorstagnogleyen aus 6 bis 10 dm Torf (Holozän) über Zersatz oder Fließschutt (Basislage) mit Zersatz aus basaltischem Vulkanit, örtl. Vulkaniklastit (Tertiär)

454 Hochmoore aus 4 bis 10 dm Torf (Holozän) über Kolluvial– oder Auensediment (Holozän) oder fluvialen Sedimenten (Pleistozän) z.T. bimsascherein., z.T. über Fließschutt (Basislage) mit Sand– bis Tonstein (Buntsandstein)

2 Böden aus fluviatilen Sedimenten

2.1 Böden aus Auensedimenten

2.1.1 Böden aus carbonathaltigen sandig–kiesigen Auensedimenten

1 Auenlockersyroseme aus Flusssand, z.T. über 2 bis 6 dm Auenschluff (Gegenwart)

26 Auenpararendzinen aus 6 bis >20 dm Auensand, örtl. über 3 bis 6 dm Auenschluff oder –lehm (Holozän), über Terrassensand (Pleistozän) oder Flusssand (Holozän)

5 Auenpararendzinen aus 6 bis 15 dm Auensand über 4 bis >10 dm Auenschluff, –ton über Flusssand (Subatlantikum)

14 Auenpararendzinen aus 3 bis 15 dm Auensand über 1 bis 3 dm Auenschluff oder –ton über 4 bis 8 dm Auenton, z.T. über 2 bis 4 dm Auenschluff, mit Carbonatanreicherungshorizont/Rheinweiß (Holozän)

4 Auenpararendzinen mit Vega, meist aus 2 bis 6 dm Auensand und –schluff, über Flusssand (Subatlantikum)

20 Auenpararendzinen mit Vega aus Auen– und/oder Flusssand z.T. Auenschluff (Holozän)

11 Auenpararendzinen mit Vega, meist aus 2 bis 3 dm Auensand oder –lehm, z.T. mit Carbonatanreicherungshorizont/Rheinweiß, über Flusssand (Holozän)

330 Auengleye mit Gleyen aus Flusssand (Holozän), örtl. Terrassensand (Pleistozän)

2.1.2 Böden aus carbonatfreien sandig–kiesigen Auensedimenten

23 Vega aus 3 bis 10 dm Auensand und/oder –lehm (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän)

383 Vega mit Gley–Vega aus 2 bis 8 dm Auensand, –schluff und/oder –lehm über Flusssand (Holozän) oder Terrassensand (Pleistozän)

395 Vega mit Gley–Vega und Kolluvisolen aus 6 bis >15 dm Auensand oder Schwemmsand über Auensand oder –schluff (Holozän)

50 Auengleye mit Pseudogley–Gleyen aus 8 bis 20 dm Auensand und/oder –lehm (Holozän) über Fließschutt (Basislage) mit silikiklastischem Sedimentgestein (Rotliegend) oder Anstehendem

47 Naßgleye aus 3 bis 6 dm Auensand (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän), örtl. silikiklastischem Sedimentgestein (Rotliegend) oder Ton (Tertiär)

2.1.3 Böden aus carbonathaltigen schluffig–lehmigen Auensedimenten

12 Auenpararendzinen mit Pararendzinen, z.T. aus 2 bis 3 dm Auenschluff oder –ton, über 3 bis >10 dm Auenschluff mit Carbonatanreicherungshorizont/Rheinweiß über Flusssand (Holozän)

72 Vega über Parabraunerde aus 6 bis >10 dm Auensand und/oder –schluff (Holozän) über 5 bis >10 dm Hochflutschluff und/oder –ton über 1 bis 6 dm Hochflutsand oder –schluff, mit Carbonatanreicherungshorizont/Rheinweiß über Terrassensand (Pleistozän)

27 Vega, örtl. aus 2 bis 3 dm Auensand, über/aus <10 dm Auenschluff oder –lehm (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän) oder Flusssand (Holozän)

25 Vega aus >10 dm Auensand und/oder –schluff (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän)

37 Vega aus >12 dm Auenschluff (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän) oder Flusssand (Holozän)

24 Vega aus 4 bis 10 dm Auenschluff (Holozän) über 3 bis 10 dm Hochflutlehm und/oder –ton über Hochflutschluff, z.T. mit Carbonatanreicherungshorizont über Terrassensand (Pleistozän)

415 Vega mit Gley–Vega aus 3 bis 6, z.T. >10 dm Auensand, –schluff und/oder Auenlehm (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän)

6 Vega mit Gley–Vega aus 4 bis 10 dm Auenschluff über Flusssand (Subatlantikum)

21 Vega mit Gley–Vega aus 4 bis 10 dm Auenschluff, –lehm und/oder –ton über Flusssand (Holozän)

7 Vega mit Gley–Vega aus >10 dm Auenschluff über Flusssand (Subatlantikum)

22 Vega mit Gley–Vega aus Auenschluff, –lehm und/oder –ton (Holozän)

413 Vega mit Gley–Vega aus 6 bis 15 dm Auenschluff (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän) oder Flusssand (Holozän)

9 Vega mit Gley–Vega aus 4 bis 10 dm Auenschluff, –lehm und/oder –ton über 2 bis 10 dm Auenschluff mit Carbonatanreicherungshorizont/Rheinweiß über Flusssand (Holozän)

8 Vega mit Gley–Vega aus 4 bis 10 dm Auenschluff (Subatlantikum) über 3 bis 6 dm Auenschluff, –lehm oder –ton, meist über 2 bis 6 dm Auenschluff mit Carbonatanreicherungshorizont/Rheinweiß, über Flusssand (Holozän)

15 Vega mit Gley–Vega aus 3 bis 12 dm Auenschluff über 2 bis 4 dm Auenschluff oder –ton über 3 bis 10 dm Auenton, meist über 2 bis 4 dm Auenschluff mit Carbonatanreicherungshorizont/Rheinweiß, über Flusssand (Holozän)

2 Gley–Vega mit Vega aus 6 bis 15 dm Auenschluff (Gegenwart) über Flusssand (subrezent)

13 Gley–Vega aus 3 bis 6 dm Auenschluff oder –ton über 2 bis 4 dm Auenschluff über Flusssand (Holozän)

28 Auengleye mit Gley–Vega, z.T. aus 2 bis >10 dm Auensand, über 3 bis 12 dm Auenschluff und/oder –lehm über Flusssand (Holozän)

30 Auengleye mit Gley–Kolluvisolen und Gley–Vega aus 3 bis >10 dm Auensediment, z.T. mit Torf über Flusssand (Holozän) oder Terrassensand (Pleistozän)

17 Auengleye mit Vega–Gleyen aus 6 bis 10 dm Auenschluff und/oder –ton über 3 bis 15 dm Auenton über 3 bis >10 dm Auenschluff und/oder –ton über Flusssand (Holozän)

3 Auengleye aus 6 bis >20 dm Auenschluff (Gegenwart) über Flusssand (subrezent)

10 Auengleye aus 5 bis >20 dm Auenschluff, –lehm und/oder –ton über Flusssand (Holozän)

92 Auengleye und Kalkgleye, z.T. aus 2 bis 5 dm Auensand, –lehm und/oder –ton (Holozän) oder Hochflutsand, –lehm und/oder –ton (Jungwürm), über 6 bis 13 dm Seekreide (Holozän oder Jungwürm) über Terrassensand (Pleistozän)

56 Auengleye mit Naßgleyen aus 3 bis 6 dm Auenschluff oder –ton über Auenton über Auenschluff, –lehm oder –ton (Holozän)

2.1.4 Böden aus carbonatfreien schluffig–lehmigen Auensedimenten

460 Vega aus Auenschluff, –lehm und/oder –ton (Holozän) mit eingeschwemmter Bimsasche (Allerød)

38 Vega mit Gley–Vega aus 4 bis >20 dm Auenschluff und/oder –ton über Auenlehm oder –ton (Holozän)

39 Vega und Gley–Vega aus 6 bis 15 dm Auensand und/oder –lehm (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän)

40 Gley–Vega mit Pseudogley–Vega aus 4 bis 10 dm Auenschluff (Holozän) über Hochflutton (Pleistozän), z.T. Auenton (Holozän)

49 Pseudogley–Gleye und Pseudogley mit Auengleyen aus 3 bis 8 dm Auenschluff, örtl. Kolluvialschluff über Auenlehm oder –ton (Holozän)

464 Auenpseudogleye aus 6 bis 8 dm Auenschluff, –lehm und/oder –ton über 2 bis 3 dm Auenschluff (Holozän) oder Hochflutschluff (Jungwürm) mit eingeschwemmter Bimsasche (Allerød) über Hochflutschluff, –lehm und/oder –ton (Pleistozän)

434 Pseudogley–Auengleye mit Auengley–Pseudogleyen aus 4 bis 10 dm Auenschluff über 4 bis 9 dm Auenschluff, –lehm oder –ton über 4 bis 10 dm Auenschluff (Holozän) oder Hochflutschluff (Jungwürm) mit eingeschwemmter Bimsasche (Allerød) über 2 bis 9 dm Hochflutschluff über Terrassensand (Pleistozän)

54 Auengleye mit abgesenktem Grundwasser mit Auengleyen aus 6 bis 10 dm Auenschluff über 5 bis 10 dm Auenton über Auenschluff oder –lehm (Holozän)

461 Auengleye mit abgesenktem Grundwasser mit Naßgleyen aus 8 bis 10 dm Auenschluff über >12 dm Auenschluff, –lehm oder –ton (Holozän)

41 Auengleye mit Vega–Gleyen und Pseudogley–Gleyen und Naßgleyen aus 8 bis >10 dm Auenschluff, –lehm und/oder –ton über Flusssand (Holozän) oder Terrassensand (Pleistozän)

355 Auengleye mit Gleyen und Pseudogley–Gleyen aus 6 bis 10, z.T. >10 dm Auenschluff und/oder –ton, z.T. aus anderen fluviatilen Sedimenten (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän)

45 Auengleye aus 4 bis 8, z.T. >10 dm Auensand, –schluff oder –lehm (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän)

46 Auengleye mit Gleyen, meist aus 3 bis 13 dm Auensand oder –lehm,, örtl. über 2 bis 8 dm Auenton (Holozän), über Terrassensand (Pleistozän)

44 Auengleye aus 3 bis >10 dm Auenschluff und/oder –lehm (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän)

43 Auengleye aus 1 bis 3 dm Auenschluff über 5 bis 12 dm Auenlehm oder –ton (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän)

42 Auengleye mit Gleyen aus >10 dm Auenschluff, –lehm und/oder –ton, örtl. Kolluvialschluff (Holozän)

471 Auengleye mit Naßgleyen und Pseudogley–Auengleyen aus 8 bis >10 dm Auenschluff, –lehm und/oder –ton über Flussand (Holozän) oder Terrassensand (Pleistozän)

472 Auengleye mit Naßgleyen aus Auenschluff, –lehm oder –ton, z.T. Stillwasserschluff oder –ton (Holozän)

59 Auengleye und Naßgleye mit Auenanmoorgleyen aus 2 bis 12 dm Auenschluff, meist über 2 bis 8 dm Auenton, über Torf (Holozän)

57 Naßgleye mit Auengleyen aus Auenschluff, –lehm und/oder –ton (Holozän)

48 Auenanmoorgleye und Naßgleye aus 3 bis 6 dm Auensand, –lehm (Holozän), örtl. Hochflutlehm (Pleistozän) über Terrassensand (Pleistozän)

58 Auenanmoorgleye und Naßgleye aus >10, örtl. 4 bis 8 dm Auenschluff, –lehm und/oder –ton, örtl. mit Torf oder Kolluvialschluff (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän)

2.1.5 Böden aus carbonathaltigen tonigen Auensedimenten

16 Humuspelosole mit Auendynamik im Untergrund mit Gley–Vega aus 1 bis 6 dm Auenschluff oder –ton über 3 bis 10 dm Auenton, meist über 2 bis 10 dm Auenschluff mit Carbonatanreicherungshorizont/Rheinweiß, über Flussand (Holozän)

18 Auengleye mit Humuspelosolen mit Auendynamik im Untergrund aus 1 bis 6 dm Auenschluff oder –ton über 3 bis 15 dm Auenton über 3 bis >10 dm Auenschluff und/oder –ton über Flussand (Holozän)

2.1.6 Böden aus carbonatfreien tonigen Auensedimenten

55 Auengleye mit abgesenktem Grundwasser mit Auengleyen aus 6 bis 15 dm Auenton über Auenschluff und/oder –ton, z. T. Torf (Holozän)

32 Anmoorgleye mit Auenanmoorgleyen aus 6 bis 10 dm Hochflutschluff, –lehm und/oder –ton (Pleistozän), örtl. Auenschluff, –lehm und/oder –ton (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän)

2.2 Böden aus Hochflutsedimenten

2.2.1 Böden aus sandigen Hochflutsedimenten und/oder solimixtiven Deckschichten

69 Pararendzinen, meist aus 2 bis 8 dm Hochflutsand, über Terrassensand (Pleistozän)

68 Parabraunerden mit Braunerden aus 3 bis 12 dm Auensand oder Hochflutsand über 2 bis 4 dm Auensand oder Hochflutsand oder –schluff mit Carbonatanreicherungshorizont/Rheinweiß über Flusssand (Holozän) oder Terrassensand (Pleistozän)

75 Parabraunerden mit Bänderparabraunerden und Braunerden aus 6 bis 8 dm Fließerde (Hauptlage), z.T. über 2 bis 8 dm Flugsand, über 2 bis 5 dm Hochflutsand oder –lehm, meist über 2 bis 4 dm Hochflutsand oder –schluff mit Carbonatanreicherungshorizont/Rheinweiß, über Terrassensand (Pleistozän)

73 Parabraunerden mit Braunerden über Parabraunerden und Pseudogley–Parabraunerden aus 3 bis 8 dm Fließerde (Hauptlage), örtl. über 2 bis 6 dm Flugsand, über 3 bis 10 dm Hochflutlehm über 1 bis 8 dm Hochflutschluff mit Carbonatanreicherungshorizont/Rheinweiß über Terrassensand (Pleistozän)

74 Parabraunerden mit Pseudogley–Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Hochflutsand (Pleistozän), örtl. Fließerde (Hauptlage) über 2 bis 4 dm Hochflutlehm, meist über 2 bis 3 dm Hochflutsand oder –schluff mit Carbonatanreicherungshorizont/Rheinweiß, über Terrassensand (Pleistozän)

87 Pseudogleye und Gley–Pseudogleye mit Parabraunerde–Pseudogleyen aus 3 bis 10 dm Fließerde (Hauptlage) oder Hochflutsand, örtl. über 2 bis 6 dm Flugsand, über 2 bis 8 dm Hochflutlehm oder –ton, meist über 2 bis 6 dm Hochflutsand oder –lehm mit Carbonatanreicherungshorizont/Rheinweiß, über Terrassensand (Pleistozän)

101 Pseudogleye und Gley–Pseudogleye mit Pseudogley–Braunerden aus 3 bis 10 dm Fließerde (Hauptlage), örtl. über 2 bis 6 dm Flugsand, über 2 bis 10 dm Hochflutlehm, z.T. über 2 bis 4 dm Hochflutsand oder –schluff mit Carbonatanreicherungshorizont/Rheinweiß, über Terrassensand (Pleistozän)

34 Gley–Pseudogleye mit Pseudogley–Gleyen aus 2 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage), meist über 4 bis 8 dm Hochflutlehm und/oder –ton, über Terrassensand (Pleistozän)

95 Parabraunerde–Gleye mit Gley–Parabraunerden aus 3 bis 8 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 6 dm Hochflutlehm über Terrassensand (Pleistozän)

84 Tschernitzen und Gleye aus 6 bis 10 dm Hochflutsand oder –lehm (Pleistozän) oder Auensand oder –lehm (Holozän) über Terrassensand (Pleistozän)

94 Pseudogley–Gleye mit Gley–Pseudogleyen und Gleyen und Auengleyen aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) oder Hochflutsand oder –schluff über 3 bis 8 dm Hochflutlehm über Terrassensand (Pleistozän)

96 Pseudogley–Gleye mit Auengleyen aus 2 bis 4 dm Fließerde (Hauptlage) oder Auensand oder –schluff (Holozän) über 3 bis 6 dm Hochflutlehm, z.T. über 2 bis 4 dm Hochflutsand oder –schluff mit Carbonatanreicherungshorizont/Rheinweiß, über Terrassensand (Pleistozän)

35 Anmoorgleye mit abgesenktem Grundwasser mit Niedermoorgleyen mit abgesenktem Grundwasser und Niedermooren mit abgesenktem Grundwasser, örtl. aus 2 bis 8 dm Torf (Holozän),, z.T. über/aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage),, meist über 2 bis 6 dm Hochflutsand, –lehm und/oder –ton, über Terrassensand (Pleistozän)

2.3 Böden aus Terrassensedimenten

104 Pararendzinen mit Kalkbraunerden, meist aus 2 bis 8 dm Sandlöss oder Flugsand (Pleistozän) oder Fließerde (Hauptlage und/oder Mittellage), über Terrassensand (Pleistozän)

106 Braunerden aus 3 bis 8 dm Fließerde (Hauptlage) über Terrassensand (Pleistozän)

105 Podsol–Braunerden mit Braunerde–Podsolen aus 3 bis 8 dm Fließerde (Hauptlage) über Terrassensand, örtl. Flugsand (Pleistozän)

107 Gley–Braunerden mit Pseudogley–Braunerden aus 3 bis 8 dm (Hauptlage) über Terrassensand (Pleistozän), örtl. über Fluvial– oder Seelehm und/oder –ton (Pleistozän oder Pliozän)

142 Gley–Pseudogleye und Pseudogleye aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage), örtl. über 2 bis 8 dm Flugsand, über 2 bis 6 dm Terrassensediment, z.T. mit Bildung von Raseneisenstein über Terrassensand (Pleistozän)

115 Braunerde–Gleye und Gley–Braunerden aus 3 bis 8 dm Fließerde (Hauptlage), örtl. über 2 bis 12 dm Flugsand, über Terrassensand (Pleistozän)

119 Podsol–Gleye aus 3 bis 8 dm Fließerde (Hauptlage), örtl. über 2 bis 6 dm Flugsand, über Terrassensand (Pleistozän)

114 Gleye mit Braunerde–Gleyen und Pseudogley–Gleyen aus 3 bis 8 dm Fließerde (Hauptlage), örtl. über 2 bis 8 dm Flugsand, über Terrassensand (Pleistozän)

116 Gleye mit Naßgleyen aus 3 bis 8 dm Fließerde (Hauptlage), örtl. über 2 bis 12 dm Flugsand, über Terrassensand (Pleistozän)

2.4 Böden aus überwiegend fluviatilen Talbodensedimenten

432 Regosole aus fluviatilen und fluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit Sand– bis Tonstein (Buntsandstein)

449 Bänderparabraunerden mit Braunerden aus fluviatilen und solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit Sand– bis Tonstein (Buntsandstein)

63 Rendzinen mit Gley–Rendzinen und Kolluvisolen aus Quellenkalk mit fluviatilen und kolluvialen Sedimenten, (Holozän bzw. Jungwürm) in unterschiedlicher Schichtung

53 Pseudogley–Gleye mit Gley–Pseudogleyen aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit Ton oder Ton– bis Schluffstein (Tertiär oder Rötl)

51 Gleye mit Gley–Kolluvisolen und Hanggleyen aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit Sand– bis Tonstein oder Ton (Buntsandstein)

427 Gleye mit Gley–Kolluvisolen und Hanggleyen aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit silikiklastischem Sedimentgestein (Perm)

52 Gleye mit Gley–Kolluvisolen und Hanggleyen aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit Plutonit oder metamorphem Schiefer (Paläozoikum)

336 Gleye mit Gley–Kolluvisolen und Hanggleyen und Pseudogleyen aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit schwach metamorph überprägtem siliziklastischem Sedimentgestein sowie Metamorphiten (Paläozoikum, Präperm)

426 Gleye mit Gley–Kolluvisolen und Hanggleyen aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit Kalkstein, örtl. Dolomitstein (Muschelkalk oder Zechstein)

353 Gleye mit Gley–Kolluvisolen und Hanggleyen aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit Metabasalt oder basaltischem Metavulkaniklastit (Paläozoikum, Präperm)

356 Gleye mit Gley–Kolluvisolen und Hanggleyen aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit Ton– bis Schluffstein oder Ton (Buntsandstein oder Keuper)

428 Hanggleye mit Kolluvisol–Hanggleyen aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit basaltischem Vulkanit (Tertiär), örtl. Anstehendem

320 Hanggleye mit Quellengleyen und Hangpseudogleyen und Braunerden aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit Plutonit (Paläozoikum)

368 Hanggleye und Quellengleye mit Gleyen aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit silizikiastischem Sedimentgestein (Zechstein)

211 Quellengleye und Hanggleye mit Hangpseudogleyen aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit basaltischem Vulkanit, örtl. Vulkaniklastit, z.T. Zersatz (Tertiär)

173 Quellengleye und Hanggleye aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) über Ton oder Tonmergel (Tertiär), z.T. Zersatz aus basaltischem Vulkanit (Tertiär)

405 Quellengleye mit Hanggleyen und Hangpseudogleyen aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit Ton– bis Sandstein (Buntsandstein)

298 Quellengleye mit Hanggleyen aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit schwach metamorph überprägtem silizikiastischem Sedimentgestein sowie Metamorphiten (Paläozoikum, Präperm) oder Zersatz (Tertiär)

429 Quellengleye mit Hanggleyen aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit Kalkstein (Muschelkalk) über solifluidalen Sedimenten (Pleistozän) mit Ton– bis Schluffstein oder Ton, örtl. Tonmergelstein (Keuper oder Rötl) oder Anstehendem

456 Naßgleye aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit Ton– bis Sandstein (Buntsandstein)

341 Naßgleye und Anmoorgleye mit Niedermoorgleyen und Hangnaßgleyen aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit schwach metamorph überprägtem silizikiastischem Sedimentgestein (Paläozoikum, Präperm)

2.5 Böden aus Auenlehmen

2.5.1 Böden aus carbonathaltigen sandig–kiesigen Auenlehmen

161 Parabraunerden mit Pseudogley–Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Tonmergel (Tertiär)

215 Parabraunerden mit Pseudogley–Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Fließschutt (Basislage) mit Kalkstein (Muschelkalk)

410 Parabraunerden mit Pseudogley–Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Fließschutt (Basislage) mit Dolomit– oder Kalkstein (Zechstein)

351 Parabraunerden mit Pseudogley–Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Residualton (Tertiär) oder Fließschutt (Basislage) mit Kalkstein (Massenkalk) oder Anstehendem

411 Pseudogleye mit Parabraunerde–Pseudogleyen aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage), meist über 2 bis 6 dm Fließerde (Mittellage), über Fließschutt (Basislage) mit Dolomit–, Kalk–, Mergel–, Ton– bis Schluffstein oder Ton (Zechstein)

167 Pseudogleye aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage), z.T. über 2 bis 8 dm Fließerde (Mittellage), über Fließschutt (Basislage) mit Ton oder Tonmergel (Tertiär)

352 Pseudogleye aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Residualton (Tertiär) aus Kalkstein (Massenkalk)

2.5.2 Böden aus lösslehmreichen Solifluktionsdecken

450 Braunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit Sandstein bis Konglomerat oder Breccie (Rotliegend)

409 Braunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit Sandstein bis Konglomerat oder Breccie, örtl. Ton (Zechstein)

416 Braunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit Sandstein (Keuper)

292 Braunerden mit Lockerbraunerden und Podsol–Braunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit Quarzit oder quarzitischem Sandstein, örtl. Schiefer (Paläozoikum, Präperm)

277 Braunerden aus 2 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit Grauwacke (Paläozoikum, Präperm)

228 Braunerden aus 2 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit Sand– bis Tonstein (Buntsandstein)

186 Braunerden aus 2 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit phonolithischen oder trachytischem Vulkanit, örtl. Vulkaniklastit (Tertiär) oder Anstehendem

312 Braunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit granitischem Plutonit (Paläozoikum)

433 Braunerden mit Pseudogley–Braunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit Metatrachyt und Metarhyolith (Paläozoikum, Präperm) oder Zersatz (Tertiär)

231 Braunerden mit Pseudogley–Braunerden und Braunerden über Fersialit aus 2 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Zersatz (Tertiär) aus Sand– bis Tonstein (Buntsandstein)

295 Pseudogleye mit Braunerde–Pseudogleyen und Podsol–Pseudogleyen aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit Zersatz (Tertiär) oder Quarzit oder quarzitischen Sandstein (Paläozoikum, Präperm)

239 Pseudogleye aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit Zersatz (Tertiär) aus Sand– bis Tonstein (Buntsandstein)

315 Pseudogleye mit Hangpseudogleyen aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage, örtl. über Mittellage) über Fließschutt (Basislage) mit Zersatz (Tertiär) oder granitischem Plutonit (Paläozoikum)

2.6 Böden aus lösslehmreichen Solifluktionsdecken

2.6.1 Böden aus lösslehmreichen Solifluktionsdecken mit carbonathaltigen Gesteinsanteilen

161 Parabraunerden mit Pseudogley–Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Tonmergel (Tertiär)

215 Parabraunerden mit Pseudogley–Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Fließschutt (Basislage) mit Kalkstein (Muschelkalk)

410 Parabraunerden mit Pseudogley–Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Fließschutt (Basislage) mit Dolomit– oder Kalkstein (Zechstein)

351 Parabraunerden mit Pseudogley–Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Residualton (Tertiär) oder Fließschutt (Basislage) mit Kalkstein (Massenkalk) oder Anstehendem

411 Pseudogleye mit Parabraunerde–Pseudogleyen aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage), meist über 2 bis 6 dm Fließerde (Mittellage), über Fließschutt (Basislage) mit Dolomit–, Kalk–, Mergel–, Ton– bis Schluffstein oder Ton (Zechstein)

167 Pseudogleye aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage), z.T. über 2 bis 8 dm Fließerde (Mittellage), über Fließschutt (Basislage) mit Ton oder Tonmergel (Tertiär)

352 Pseudogleye aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Residualton (Tertiär) aus Kalkstein (Massenkalk)

2.6.2 Böden aus lösslehmreichen Solifluktionsdecken mit basischen Gesteinsanteilen

467 Braunerden aus 6 bis 10 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit basaltischem Vulkanitschutt (Tertiär)

198 Pseudogley–Parabraunerden und Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Fließschutt (Basislage) mit basaltischem Vulkaniklastit (Tertiär) oder Anstehendem

197 Pseudogley–Parabraunerden mit Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Fließschutt (Basislage) mit basaltischem Vulkanit, örtl. Vulkaniklastit (Tertiär)

196 Pseudogley–Parabraunerden mit Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Fließschutt (Basislage) mit basaltischem Vulkanit, örtl. Vulkaniklastit oder Zersatz (Tertiär)

347 Pseudogley–Parabraunerden mit Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Fließschutt (Basislage) mit Metabasalt (Paläozoikum, Präperm)

382 Pseudogley–Parabraunerden mit Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Fließschutt (Basislage) mit Metabasalt oder basaltischem Metavulkaniklastit (Paläozoikum, Präperm) oder Zersatz (Tertiär)

270 Pseudogley–Parabraunerden mit Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Fließschutt (Basislage) mit Zersatz (Tertiär) oder basaltischem Metavulkaniklastit (Paläozoikum, Präperm)

466 Pseudogley–Parabraunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) mit basaltischem Vulkanit (Tertiär) über 3 bis 12 dm Fließerde (Mittellage) mit basaltischem Vulkanit (Tertiär) über Fließschutt (Basislage) mit Zersatz (Tertiär) oder Schiefer oder Grauwacke Anstehendem (Paläozoikum, Präperm)

204 Pseudogleye und Hangpseudogleye mit Parabraunerde–Pseudogleyen aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Fließschutt (Basislage) mit basaltischem Vulkanit oder Zersatz (Tertiär)

209 Hangpseudogleye und Pseudogleye mit Pseudogley–Gleyen und Pseudogley–Kolluvisolen und Gley–Kolluvisolen aus 6 bis 8 dm Fließerde (Hauptlage), meist über 2 bis 8 dm Fließerde (Mittellage), über Fließschutt (Basislage) mit basaltischem Vulkanit (Tertiär)

271 Pseudogleye aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über 3 bis 8 dm Fließerde (Mittellage) über Fließschutt (Basislage) mit Metabasalt oder basaltischem Metavulkaniklastit (Paläozoikum, Präperm) oder Zersatz (Tertiär)

2.6.3 Böden aus lösslehmhaltigen Solifluktionsdecken mit sauren Gesteinsanteilen

450 Braunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit Sandstein bis Konglomerat oder Breccie (Rotliegend)

409 Braunerden aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) mit Sandstein bis Konglomerat oder Breccie, örtl. Ton (Zechstein)

416 Braunerden aus 3 bis 6